

ВЫ МОЖЕТЕ СПАСТИ ЖИЗНЬ! ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

Симптомы возможного инфаркта миокарда:



- сильная давящая или сжимающая боль за грудиной, в некоторых случаях отдает в руку, плечо, шею, спину или челюсть (продолжительность – более 10 минут)
- может сопровождаться: ощущением нехватки воздуха, головокружением и холодным потом, тошнотой

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ИНФАРКТ МИОКАРДА:

- 1 Немедленно вызовите скорую помощь!
- 2 Уложите пострадавшего на спину, голова должна находиться в приподнятом положении. При наличии одышки предпочтительно положение сидя.
- 3 Обеспечьте пострадавшему максимальный доступ свежего воздуха (снимите или расстегните тесную одежду, откройте окно и т.д.).
- 4 Дайте пострадавшему таблетку нитроглицерина под язык.

ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ **103 (или 112)**

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНСУЛЬТЕ

ФОРМУЛА РАСПОЗНАВАНИЯ ИНСУЛЬТА



Улыбка

при инсульте улыбка кривая



Движение

при инсульте не получится одновременно поднять обе руки: одна будет отставать или не двигаться



Артикуляция

при инсульте речь невнятная или заторможенная



Решение

если вы увидели хотя бы один признак, **НЕМЕДЛЕННО**

ВЫЗОВИТЕ СКОРУЮ ПОМОЩЬ!



ДО ПРИЕЗДА ВРАЧЕЙ:



- уложите пострадавшего так, чтобы голова была выше туловища;
- предоставьте пострадавшему доступ свежего воздуха, снимите стесняющую одежду;
- при инсульте возможна рвота – в этом случае поверните голову пострадавшего набок;
- если человек в ясном сознании и глотание не нарушено, дайте ему глицин – 3 таблетки под язык.



КАК ВЫЗВАТЬ БРИГАДУ СКОРОЙ ПОМОЩИ С СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА:

МЕГАФОН 030

МТС 030
0803

UTEL 030

БИЛайн 003

МОТИВ 303

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНСУЛЬТЕ ФОРМУЛА РАСПОЗНАВАНИЯ ИНСУЛЬТА



Улыбка

при инсульте улыбка кривая



Движение

при инсульте не получится одновременно поднять обе руки: одна будет отставать или не двигаться



Артикуляция

при инсульте речь невнятная или заторможенная



Решение

если вы увидели хотя бы один признак, **НЕМЕДЛЕННО**

ВЫЗОВИТЕ СКОРУЮ ПОМОЩЬ!

ДО ПРИЕЗДА ВРАЧЕЙ:



- уложите пострадавшего так, чтобы голова была выше туловища;



- предоставьте пострадавшему доступ свежего воздуха, снимите стесняющую одежду;



- при инсульте возможна рвота – в этом случае поверните голову пострадавшего набок;

- если человек в ясном сознании и глотание не нарушено, дайте ему глицин – 3 таблетки под язык.

**ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 103 (или 112)**