

Профилактика бруцеллеза

- не приобретайте мясо и мясные продукты (фарш, колбаса, полуфабрикаты), молоко и молочные продукты в местах несанкционированной торговли
- употребляйте молоко, молочные продукты и мясо после тщательной термической обработки
- используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты (маски, резиновые перчатки) при уходе за сельскохозяйственными животными

Вакцинация против бруцеллеза

проводится по эпидемическим показаниям лицам из групп риска



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1
e-mail: cgon@cgon.ru; тел.: 8 (499) 241 86 28



Бруцеллез

Бруцеллез

это зоонозное особо опасное инфекционно-аллергическое заболевание, вызываемое бактериями рода *Brucella*

Источник инфекции

больные бруцеллезом овцы, козы, крупный рогатый скот и свиньи

Заржение возможно

от северных оленей, верблюдов, собак и других животных

Группы риска:

- сельскохозяйственные работники,
- работники животноводческих ферм, мясо- и молококомбинатов и других предприятий по переработке продуктов и сырья животного происхождения,
- персонал лабораторий, работающий с вирулентными культурами

Бруцеллез не передается от человека к человеку

Пути передачи:

• алиментарный


при употреблении мяса, молока и молочных продуктов, не прошедших достаточную термическую обработку

• контактный

при уходе за больными животными, при контакте с продуктами и сырьем животного происхождения

• воздушно-пылевой

при вдыхании пыли, содержащей контаминированные бруцеллами фрагменты шерсти, навоза, земли



Симптомы бруцеллеза

- лихорадка
- слабость
- потливость или озноб
- головная боль
- боль в мышцах и суставах
- увеличение лимфатических узлов

Хроническая форма

брюцеллеза формируется при несвоевременном или неадекватном лечении.

Для хронического бруцеллеза наиболее типичны поражения опорно-двигательного аппарата: полиартрит, бурсит, экзостозы, сакроилеит, миозит.

Реже поражаются нервная, половая, сердечно-сосудистая системы и органы зрения.

