

Гепатит D



Вирусный гепатит D (дельта-вирусная инфекция) — инфекционное заболевание, характеризующееся симптомами острого поражения печени и интоксикации.


Источник инфекции — больные острой и хронической дельта-вирусной инфекцией.

Гепатит D передается через любые повреждения кожи и слизистых оболочек при контакте с инфицированной кровью или биологическими жидкостями:

- при незащищенном половом контакте,
- при совместном использовании маникюрных принадлежностей, бритв, зубных щеток;
- при совместном использовании шприцев и игл (у потребителей инъекционных наркотиков);
- при нанесении татуировок, проведении косметологических и медицинских процедур, маникюра с нарушением санитарно-эпидемиологического режима;
- от матери к ребенку во время родов.

Размножение дельта-вируса возможно только при наличии в организме вируса гепатита B.

Гепатит B с дельта-агентом, как правило, протекает тяжелее, чем неосложненный гепатит B. Он отличается агрессивным течением и быстрым развитием цирроза печени.



Вакцинация здоровых людей против гепатита B обеспечивает защиту и от дельта-вирусной инфекции

Меры профилактики гепатита D

- маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг, косметологические процедуры проводить в заведениях с надежной репутацией,
- перед процедурой обязательно убедиться, что в салоне все инструменты, в том числе одноразовые, — стерильны,
- избегать использования любых чужих колющих, режущих предметов, медицинских, маникюрных инструментов и средств личной гигиены (зубных щеток, бритвенных станков),
- придерживаться принципов разумного поведения в личной жизни,
- регулярно обследоваться на вирусные гепатиты,
- вакцинироваться против вирусного гепатита B.